



## **Encuentro Iberoamericano de Observatorios Nacionales de Drogas OID-CICAD-OEA**

**Bogotá, Colombia 20 y 21 de marzo de 2012**



# Situación epidemiológica en Argentina 2011

Mgter. Graciela Ahumada  
Coordinadora del Área de Investigaciones  
Observatorio Argentino de Drogas - SEDRONAR



# Consumo reciente de sustancias de uso indebido e ilícitas


Prevalencia de año, por edad y sexo

Sustancias seleccionadas

Población de 16 a 65 años. Estudios Nacionales



# Prevalencia de año de sustancias ilícitas. Población de 16 a 65 años






# Consumo actual de tabaco y alcohol

Prevalencia de mes, por sexo y edad




## Prevalencia de mes de tabaco y alcohol. Población de 16 a 65 años.





## Prevalencia de mes de tabaco según sexo. Población de 16 a 65 años.





## Prevalencia de mes de tabaco según edad. Población de 16 a 65 años






# Uso problemático de alcohol y dependencia




## Uso problemático de alcohol (AUDIT) Estudios nacionales en población de 16 a 65 años. Argentina 2008 y 2010





## Dependencia de marihuana y cocaína. Población de 16 a 65 años con consumo en el último año.









**Edad de inicio**

## Promedio de edad de inicio en el consumo de alcohol y tabaco. Población de 16 a 65 años.





## Promedio de edad de inicio en el consumo de drogas ilícitas. Población de 16 a 65 años.



# Población en riesgo y Tolerancia


Disponibilidad, accesibilidad y tolerancia

Población de 16 a 65 años




# Porcentaje de población que considera fácil el acceso a drogas.

## Población de 16 a 65 años




## Porcentaje de población que recibió oferta de drogas. Población de 16 a 65 años






## Porcentaje de personas que evalúan de Gran Riesgo el consumo de sustancias. Población de 16 a 65 años.



## Porcentaje de personas que evalúan de Ningún Riesgo el consumo de sustancias. Población de 16 a 65 años.






# **Tendencia en el consumo en adolescentes escolarizados**

Estudios Nacional en Estudiantes del Nivel Medio  
2001, 2005, 2007 y 2009



# Prevalencias de mes de tabaco y alcohol y abuso de alcohol


---





# Prevalencia de mes de consumo de tabaco según sexo y edad

## Tabaco





# Porcentaje de estudiantes con consumo abusivo de alcohol, según edad y sexo


---

varones	mujeres	14 años o menos	15-16 años	17 años y más
---------	---------	-----------------	------------	---------------





# Prevalencia de año de drogas ilícitas






# Medio social y condiciones de vulnerabilidad en adolescentes

Estudios Nacional en Estudiantes del Nivel Medio  
2001, 2005, 2007 y 2009




# Consumo de marihuana y percepción de riesgo de consumir alguna vez



## Oferta, facilidad de acceso y prevalencia de año de marihuana


---





# Consumo actual de tabaco y percepción de riesgo de consumir frecuentemente

---



# Indicadores de tratamiento

Estudio Nacional en Pacientes en tratamiento 2010

Encuesta Nacional en población general 2010



# Indicadores de demanda de tratamiento. Argentina 2010


Indicador	Dato y fuente
<b>Cantidad de demandantes potenciales</b> (Usuarios problemáticos de alcohol y drogas)	<b>1.523.551 personas</b> <b>(Estudio nacional en población general)</b>
<b>Tasa general de demanda potencial</b> (Demanda potencial/total de usuarios de SPA en los últimos 12 meses)	<b>12.3%</b>
<b>Cantidad de demanda realizada</b> (Personas que buscaron tratamiento en el último año)	<b>136.386 personas</b> <b>(Estudio nacional en población general)</b>
<b>Tasa global de demanda realizada</b> (Demanda realizada/total de usuarios de SPA en los últimos 12 meses)	<b>1.1%</b>
<b>Tasa específica de demanda realizada</b> (Demanda realizada/total de usuarios problemáticos en los últimos 12 meses)	<b>9%</b>
<b>Demanda realizada</b>	<b>21.252</b> pacientes en centros de tratamiento <b>44.904</b> pacientes estimados en tratamiento en todos los tipos de dispositivos o grupos
<b>Tasa de demanda efectiva en CT</b> (Demanda efectiva/total de demanda realizada)	<b>15.6%</b> <b>(Estudio nacional en pacientes y en población general)</b>
<b>Tasa de demanda efectiva en CT y grupos</b> (Demanda efectiva en grupos y CT/total de demanda realizada)	<b>32,9%</b>

# Cantidad de drogas consumidas en la vida según grupos de edad





## Cantidad de drogas consumidas en la vida según grupos de edad (excepto alcohol y tabaco)





## Distribución porcentual de los pacientes según drogas consumidas durante la vida de acuerdo a cronología de su uso

Sustancias	Droga de inicio	2ª droga	3ª droga	4ª droga	5ª droga	6ª droga
Alcohol	40,8	32,4	12,6	7,5	4,9	2,9
Tabaco	32,1	17,8	7,2	2,4	2,6	1,6
Solventes o inhalables	2,9	2,6	4,0	6,8	8,0	7,2
Marihuana	13,6	25,9	34,4	13,2	5,4	1,4
Alucinógenos	0,7	1,3	2,5	6,8	11,7	22,7
Opiáceos	0,3		0,8	1,0	0,6	3,2
Cocaínas	6,8	12,4	28,7	34,6	26,6	21,0
Pasta base	0,3	1,6	2,4	7,8	15,7	16,0
Tranquilizantes	2,1	4,1	5,2	16,4	17,7	17,0
Estimulantes	0,1	0,5	1,6	1,5	2,8	0,4
Éxtasis			0,4	1,3	3,0	4,8
Otras drogas	0,3	0,5	0,3	0,4	0,9	1,8
Total %	21252	19558	15914	11484	6924	3253




qLa edad de inicio promedio en el consumo es de 14.7 años. Entre la primera droga y la sexta se suceden un promedio de 3.9 años.

qSi excluimos de la contabilidad las sustancias lícitas, la marihuana se perfila como la droga de inicio en el 50.3% de los casos.



# Droga de inicio según sexo y edad de inicio



## Promedio de edad de inicio:

ØAlcohol: 15.4

ØTabaco: 13.6

ØSolventes: 11.5

ØMarihuana: 14.9

ØAlucinógenos:

15.6

ØCocaínas: 16.2

ØTranquilizantes:

18.9



# Consumo simultáneo de dos o más sustancias

Drogas involucradas en el policonsumo




El 46.8% de los pacientes declararon policonsumo, en el momento de mayor consumo y en el transcurso de un mes.




# Consumo simultáneo de dos o más sustancias

Nº de drogas consumidas en el momento de mayor consumo



Nº de drogas según sexo y edad



## Droga de que motiva el tratamiento según sexo


Sustancias	Varones	Mujeres	Total
Alcohol	19,1	26,9	20,5
Tabaco	1,4	0,8	1,3
Solventes o inhalables	3,2	2,3	3,0
Marihuana	11,4	7,1	10,6
Alucinógenos	0,4	0,1	0,4
Opiáceos	1,0	1,5	1,1
Cocaína	39,2	34,7	38,4
Tranquilizantes	3,7	8,7	4,6
Estimulantes	0,1	1,3	0,3
Pasta base	10,0	5,1	9,1
Éxtasis	0,4		0,3
Otras Drogas	0,4	0,7	0,4
Combinación de drogas	9,8	10,7	9,9
Total	N= 17.200	N= 2.857	100



En el 89.5% de los casos la droga que motiva el tratamiento coincide con la droga identificada por los pacientes como la que le ocasionó mayor daño



## Droga que motiva el tratamiento según grupos de edad



**GRACIAS POR LA ATENCIÓN!**

Graciela Ahumada

[www.observatorio.gob.ar](http://www.observatorio.gob.ar)

