



**SEXAGÉSIMO CUARTO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
Del 19 al 21 de noviembre de 2018
Washington, D.C., EE.UU**

**OEA/Ser.L/XIV.2.64
CICAD/doc.2423/18
16 de noviembre de 2018
Original: Inglés**

**Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas 2018
Presentación preliminar**

Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas 2018

Presentación preliminar



OAS | More rights
for more people



OAS

More rights
for more people

Informe sobre el consumo de drogas en las Américas 2019

- Tercer informe sobre el uso de drogas para el Hemisferio.
- Centrado en el consumo de drogas.
- Análisis en profundidad sobre las tendencias.





OAS

More rights
for more people

Estructura del informe

- Resumen ejecutivo, métodos
- 1. Alcohol
- 2. Tabaco
- 3. Cannabis
- 4. Inhalables
- 5. Cocaínas
- 6. Estimulantes de tipo anfetamina
- 7. Uso de medicamentos sin receta
- 8. Drogas emergentes

CAPÍTULO 1:

ALCOHOL

Introducción

El alcohol es una de las sustancias psicoactivas más comúnmente usadas en el mundo. Su uso es especialmente preocupante en las Américas, donde se estima que el consumo total de alcohol per cápita es superior al promedio mundial. En los últimos cinco años ha incrementado la tasa de episodios de consumo excesivo, tanto en hombres como en mujeres¹. La última información disponible a nivel internacional indica que el consumo de alcohol provocó más de 300.000 muertes en las Américas; de ellas 80.000 de ellas el consumo de alcohol fue determinante. Por otra parte, el consumo nocivo de alcohol es la causa principal de más de 200 tipos de enfermedades y lesiones, y es responsable por la muerte de aproximadamente 3,3 millones de personas al año en todo el mundo, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), correspondiente a 2012².

El consumo de alcohol es uno de los riesgos más importantes para la salud, especialmente en los países de las Américas con ingresos bajos y medios, y su consumo está asociado tanto con la incidencia de enfermedades, como con diversos problemas sociales^{3,4} y guarda una estrecha relación con la violencia doméstica, el abandono y el abuso infantil, la delincuencia y las conductas delictivas^{5,6,7,8,9,10,11} afectando no solamente la calidad de vida de quien consume, sino del entorno familiar y social.

Los adolescentes son un grupo especialmente vulnerable, debido a que están en su etapa de desarrollo. Hay estudios que indican que el primer consumo de alcohol antes de los 15 años de edad, tiene relación

1 PAHO-WHO (2015): Regional Status Report on Alcohol and Health in the Americas.

2 Organización Mundial de la Salud (OMS) (2014): Informe Mundial de Situación sobre Alcohol y Salud.

3 Organización Mundial de la Salud (OMS) (2014): Informe Mundial de Situación sobre Alcohol y Salud.

4 Taylor B, Rahm J, Caldera-Aburto J, Bejarano J, Capelano C, et al. (2007): Alcohol, Género, Cultura y Delitos en las Américas. Washington, D.C., OPS.

5 Ellsberg M, Paña K, Herrera A, Lijstrand J, Winkvist A, Cardes H, et al. Women's experience of violence in Nicaragua. *Soc Sci Med* 2000; 51(11):1595-616.

6 Rodgers K. Wife assault: the findings of a national survey. *Archiv Service Bulletin*, 1994;14 (1) - 22.

7 INEGI 2003: Mujeres violentadas por su pareja en México. Ciudad de México, México, 2003.

8 OMS (2008): Violencia interpersonal y alcohol. Ginebra, Suiza.

9 OMS (2006): Maltrato infantil y alcohol. Ginebra, Suiza.

10 Walsh C, MacMillan HL, Januszko E. The relationship between parental substance abuse and child maltreatment: Findings from the Ontario Health Supplement. *Child Abuse Negl* 2001; 27(1-2):1409-29.

11 Dalke S. The toxicology of homicide offenders and victims: A review. *Drug Alcohol Rev* 2010; 29(2):202-15.



OAS

More rights
for more people

Estructura del informe - continuación.


- Cada capítulo resume la información más reciente disponible sobre la prevalencia del consumo de drogas entre estudiantes de secundaria, población general y estudiantes universitarios.
 - Género
 - Grado escolar
 - Percepción del riesgo
 - Percepción de acceso y ofertas



OAS

More rights
for more people

Métodos de recopilación de datos



- Protocolos de investigación estandarizados
- Usado por la mayoría de los Estados Miembros
- Indicadores básicos estandarizados (prevalencia, percepción de riesgo, oferta de drogas, etc.)



OAS

More rights
for more people

Proceso de revisión de pares

- Un grupo de trabajo técnico para revisar la versión preliminar convocado del 7-9 de marzo 2018 con representantes de ONDs y expertos en la investigación en español.
- Presentaciones a los ONDs
 - Caribeños – Guyana, Mayo 2018
 - Latinoamericanos – Guatemala, Agosto 2018
- Revisión de expertos externos.
- Revisión final por todos los ONDs.
- Revisión editorial (actual).



OAS

More rights
for more people

Limitaciones

- Datos oficiales de los ONDs
 - Sin ajustar por diferencias poblacionales entre países.
- Diferencia en años de estudio en diferentes países.
- Ausencia de datos de algunos países.



OAS

More rights
for more people



Resumen de hallazgos



OAS

More rights
for more people

Cuatro áreas relevantes para la política hemisférica de drogas

- 1. Tendencias en el consumo de drogas.***
- 2. Inicio del consumo de drogas a edades tempranas.***
- 3. Cambios en el consumo de drogas por sexo.***
- 4. Nuevos desafíos.***



OAS

More rights
for more people

1. Tendencias en el consumo de drogas

- El tabaco muestra disminuciones sistemáticas en el uso a lo largo del tiempo.
- En la población general, el consumo de cannabis está aumentando en la mayoría de los países que tienen datos de tendencias .
- Aproximadamente la mitad de los países, muestran aumentos en el consumo de cocaína.



OAS

More rights
for more people

Tendencias en el consumo de drogas – continuado.

- En la población de estudiantes de enseñanza secundaria:
 - Alcohol en descenso o estable en estudiantes.
 - Cannabis aumentos en el consumo en la mayoría de los países.
 - Las tendencias de la cocaína son más variadas.




OAS

More rights
for more people

Tendencias en el consumo de Tabaco

- La única substancia que muestra descensos sistemáticos en el consumo a través de las poblaciones y países

Prevalencia último mes del consumo de tabaco en escolares secundarias, Chile






OAS

More rights
for more people

Tendencias en el consumo de Tabaco

- Muestra descensos sistemáticos en el consumo a través de las poblaciones y países
- Importante medir uso de los cigarrillos electrónicos.

Prevalencia último mes del consumo de tabaco en escolares secundarias, Chile





OAS

More rights
for more people

Tendencias cannabis

- Consumo en aumento
 - la población general
 - escolares secundarios estable o en aumento en la mayoría de los países.
- 8° grado - 4 países 20% o más prevalencia último año
- Consumo por sexo similar en el tiempo
- Percepción de la disminución del riesgo.
- Percepción de acceso


Es importante empezar a medir la frecuencia y intensidad del uso y potencia de la THC.



OAS

More rights
for more people

Percepción de gran riesgo por el consumo ocasional de marihuana, estudiantes secundaria






OAS

More rights
for more people

Percepción de gran riesgo por el consumo ocasional de marihuana, estudiantes secundaria






OAS

More rights
for more people

Percepción de fácil acceso a la marihuana, entre los estudiantes de enseñanza secundaria






OAS


More rights
for more people

Percepción de fácil acceso a la marihuana, entre los estudiantes de enseñanza secundaria




Prevalencia de último año de consumo de marihuana en estudiantes de enseñanza secundaria


Argentina




Barbados




Chile




Colombia



Costa Rica




El Salvador




Prevalencia de último año de consumo de marihuana en estudiantes de enseñanza secundaria


Grenada




Paraguay




Perú



Estados Unidos



Uruguay





OAS

More rights
for more people

2. Inicio del consumo de drogas a edades tempranas

- Mientras más jóvenes comienzan a consumir drogas, mayores son los riesgos para la salud y otras consecuencias
- Programas de prevención y otras intervenciones que pueden retrasar la edad de inicio
- Existe consumo en estudiantes del 8º grado en escolares secundarias
- El consumo excesivo es una conducta de alto riesgo.



OAS

More rights
for more people

Alcohol – estudiantes secundarias


- En 23 de 31 países, 20% o más de los estudiantes de secundaria han consumido alcohol el mes pasado.
 - En 15 países, más del 30% han consumido el mes pasado.
 - En 4 países más del 40% han consumido el mes pasado.
- Uso entre los alumnos de octavo grado
 - 10 países mas del 20%
 - 3 países mas del 30%




OAS

More rights
for more people

Prevalencia último mes de consumo de alcohol entre los estudiantes de enseñanza secundaria, ordenado por subregión



Porcentaje de *binge drinking* sobre el total de estudiantes de enseñanza secundaria que consumieron alcohol en el último mes, por país, ordenado por subregión





OAS

More rights
for more people

Puntos relevantes para alcohol y cannabis

- Uso temprano
 - Indicador: edad de primer uso.
- Frecuencia e intensidad del consumo
 - Cuán frecuentemente toman y cuanto toman en un solo evento.
- Probable que estas dos conductas estarán asociados con futuros riesgos a la salud, pero no se puede ver eso por otros 20-25 años.



OAS


More rights
for more people

3. Cambios en el consumo de drogas por sexo


- Enseñanza secundaria:
 - La prevalencia de consumo de alcohol e inhalables similar por sexo.
 - Varones tienen mayor consumo de cocaína y las cocaínas fumables.
 - Consumo no-medico de tranquilizantes mas alto en mujeres en todas las poblaciones.

Tranquilizantes


Proporción de países con prevalencia de último año mayor entre mujeres:




Población en general




Estudiantes de enseñanza secundaria




Estudiantes universitarios



Relación de la prevalencia del uso de diferentes sustancias entre mujeres y hombres:



Prevalencia de último año de consumo de tranquilizantes sin prescripción médica en estudiantes de enseñanza secundaria




4. Nuevos desafíos

- Aparición de nuevas sustancias psicoactivas (NSP)
- Heroína
- Otros opioides
- Consumo no-médico de fármacos
 - Benzodiacepinas
- Adulterantes tóxicos
- Importancia de sistemas de alerta temprana (SATs)



EUA Número de muertes por intoxicación con medicamentos de prescripción controlada que involucran drogas ilícitas seleccionadas, 2008-2015



Fuente: National Center for Health Statistics / Centers for Disease Control and Prevention, USA.



OAS

More rights
for more people

Resumen

- Tendencias en el consumo de drogas
 - Imperativo para las políticas basadas en evidencia
- Inicio del consumo a edades tempranas
 - Indicador importante para riesgos en la salud
 - Necesidad de mirar frecuencia e intensidad del uso
- Cambios en el consumo de drogas por sexo
 - Mejorar indicadores sobre genero
- Nuevos desafíos
 - Sistema de Alerta Temprana
 - SAT regional



OAS

More rights
for more people

Agradecimientos

- Agradecemos a USINL por el apoyo financiero, y a los **Observatorios Nacionales de Drogas** en los Estados Miembros, sin los cuales este análisis no hubiera sido posible.

Marya Hynes

- Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID)
 - Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)
 - mhynes@oas.org
-



OAS | More rights
for more people

19/11/2018