

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS

cicad

CUADRAGESIMO PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
Del 2 al 4 de mayo de 2007
Washington, DC

OEA/Ser.L/XIV.2.41
CICAD/doc.1562/07
4 mayo 2007
Original: español

ESTUDIO PILOTO MULTICÉNTRICO SOBRE “DROGAS, MUJERES Y VIOLENCIA EN LAS AMÉRICAS”



ESTUDIO PILOTO MULTICÉNTRICO SOBRE “DROGAS, MUJERES Y VIOLENCIA EN LAS AMÉRICAS”

Informe Preliminar

Washington DC, 2007

CICAD - Sección de Desarrollo Educativo e Investigación

Justificación

- Escasez de investigaciones científicas en la temática;
- Necesidad de evidenciar la magnitud del problema en la mujer latina y sus repercusiones en la familia-sociedad;
- Incremento del abuso de drogas en mujeres de Latinoamérica;
- Legislación protección para la mujer es limitada en Latinoamérica;
- Estigmatización social hace que la mujer latina no busque ayuda y protección legal;
- Necesidad de estudios hemisféricos comparativos.

Propósito

Explorar las Experiencias Colectivas e Individuales de Mujeres Latinas Sobre el Uso y Abuso de Drogas, Violencia y Situación de la Pareja.

Objetivos

- Identificar la frecuencia del abuso de drogas, situaciones de violencia y pareja;
- Describir las experiencias y percepciones colectivas e individuales relacionadas al abuso de drogas, situaciones de violencia y pareja;
- Determinar factores socio-demográficos, culturales asociados al abuso de drogas, situaciones de violencia y pareja;
- Comparar los resultados de 10 países de habla hispana, Brasil y los Estados Unidos (mujeres latinas).

Países y Universidades Participantes

Países	Universidades
Argentina	Univ. Nacional de Córdoba; Universidad Nacional de Rosario
Bolivia	Univ. Mayor de San Andrés
Brasil	Univ. Federal de Santa Catarina; Univ. de São Paulo/Ribeirao Preto Univ. Estadual do Rio de Janeiro; Univ. Federal do Rio de Janeiro Univ. Fundação ABC
Chile	Univ. de Concepción
Colombia	Univ. Nacional de Colombia; Pontificia Universidad Javeriana
Costa Rica	Univ. de Costa Rica
Ecuador	Univ. de Guayaquil
EEUU	Univ. of Maryland; Univ. of Miami; Univ. of Michigan
Honduras	Univ. Nacional Autónoma de Honduras
México	Univ. Autónoma de Nuevo León; Univ. de Guanajuato; Univ. Autónoma de Querétaro
Perú	Univ. Peruana Cayetano Heredia
Venezuela	Univ. de Carabobo

Marco Conceptual



Modelo Conceptual Crítico-Holístico aplicado al Estudio Multicéntrico sobre
“Drogas, Mujeres y Violencia en las Américas” (Wright, 2006)

Marco Operacional



Modelo Operacional Crítico-Holístico aplicado al Estudio Multicéntrico sobre "Drogas, Mujeres y Violencia en las Américas" (Wright, 2006)

Coordinación, Ejecución y Financiamiento

Coordinación General:	CICAD/SENAD
Ejecución Nivel País:	22 Universidades distribuidas en 12 países de las Américas
Financiamiento:	CICAD – Gobierno de EEUU SENAD/SENASP – Brasil
Propuesta Modelo:	Elaborada por las Universidades de Miami, Maryland y Michigan de los EEUU
Propuesta Modelo Traducida:	Al español y portugués, y adaptada culturalmente, para ser utilizada por las 19 Universidades participantes de América Latina.

Metodología

Tipo Estudio:	Transversal
Abordaje:	Cualitativo/Cuantitativo
Aprobación Comité Ética:	Universidades
Muestra:	Intencional - 889 Mujeres / 16-60 años
Técnica de Colección de Datos:	Grupos Focales, Entrevista Individuales, Cuestionarios (validados)
Recolección Datos:	Comunidades de Bajos Ingresos
Convocatoria:	Panfletos, Carteles
Análisis Datos:	Cualitativa: Categorías, Sub-Categorías Cuantitativa: Descriptiva, Multivariada, Correlación, Regresión
Productos:	Informes Técnicos, Artículos Científicos, Red de Universidades e investigadores en la temática

Resultados Cuantitativos del Estudio Piloto Multicéntrico en 10 Países de Habla Hispánica

Argentina

Bolivia

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

Honduras

México

Perú

Venezuela

Características Sociodemográficas (Variables Continuas)


Muestra poblacional	420 casos
Edad promedio	36 años
Nivel de escolaridad	promedio de 8.3 Años (educación primaria)
Número de hijos	3 hijos (promedio: 2.8)
Número de parejas en la vida	2 parejas (promedio: 2.2)
Estado marital	65.8% mujeres viven con su pareja
Estado laboral	44.3% mujeres tienen trabajo remunerado <ul style="list-style-type: none">▪ 39.5% trabajadora servicios▪ Otras trabajan como comerciantes y vendedoras; trabajo técnico-administrativo

Fuente: CDP

n = 420

Rangos de la Escala de Depresión por País

(Escala de Radloff, 1977)



■ Posible Depresión n=277


■ No Depresión n=143

n = 420

$\chi^2 = 24.01, p = .004$

Consumo de Bebidas Alcohólicas por País

(TWEAK – Cyr & McGarry, 2002)



■ Consumo Sensato

■ Riesgo de Alcoholismo

■ Probable Alcoholismo

$\chi^2 = 13.48, p = .142$

$n = 420$
 $n 1$ (Consumen alcohol) = 270
 $n 2$ (No consumen alcohol) = 250


Drogas Psicoactivas

(Sobell & Sobell, 2003)

Tipo de Consumo	Tipo de Drogas
Drogas Ilícitas 11.8 % de la muestra <i>n</i> =49	<ul style="list-style-type: none">▪ Cannabis - 6.2%▪ Cocaína y Crack – 5.3%▪ Heroína – 1.2%▪ Inhalantes – 1.2%▪ Alucinógenos – 0.5%
Drogas Médicas 17.7% de la muestra <i>n</i> =74	<ul style="list-style-type: none">▪ Benzodiazepinas – 14.1%▪ Opiáceos (Morfina, Codeína) – 3.3%▪ Anfetaminas – 2.9%▪ Sedativos / Barbitúricos – 2.9%▪ Metadonas – 1%

n = 420
n 1 (Consumen drogas) = 123
n 2 (No consumen drogas) = 297

Comparación entre Consumo de Drogas Ilícitas en la Vida y en el Último Año




■ **Alguna vez en la Vida** n = 49
 $\chi^2 = 13.48, p = .142$

■ **En el Último Año** n = 27
 $\chi^2 = 14.84, p = .095$

n = 420
n Consumen = 76


Comparación entre Consumo de Drogas de Prescripción Médica en la Vida y en el Último Año por País



n = 420
n Consumen = 117

Víctimas de Violencia Física por País

(Escala de Violencia, Peragallo & González, 2006)




■ Antes de los 18 años de edad n = 125
 $\chi^2 = 29.38, p = .001$

■ Edad Adulta n = 162
 $\chi^2 = 21.22, p = .012$

n = 420
 n Víctimas Violencia Física = 287

Víctimas de Violencia Sexual por País

(Escala de Violencia, Peragallo & González, 2006)




■ Antes de los 18 años de edad n = 77
 $\chi^2 = 13.93, p = .123$

■ Edad Adulta n = 70
 $\chi^2 = 12.56, p = .183$

n = 420
n Víctimas Violencia Sexual = 147

Víctimas de Violencia Verbal por País

(Escala de Violencia, Peragallo & González, 2006)



■ Antes de los 18 años de edad n = 176

■ Edad Adulta n = 215



$\chi^2 = 22.61, p = .007$

$\chi^2 = 40.4, p = <.001$


n = 420

n Víctimas Violencia Verbal = 391

Coeficiente de Correlación de Spearman para las Variables del Estudio y su valor de p



Modelo de Regresión Lineal Múltiple: Variables predictoras del consumo de alcohol (TWEAK) [Procedimiento Backward]



Resultados Cualitativos del Estudio Piloto Multicéntrico en 10 Países de Habla Hispánica

Argentina

Bolivia

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

Honduras

México

Perú

Venezuela

Categoría: Consumo de Drogas



Categoría: Violencia

**Actitud ante violencia
y cultura de género**

Violencia física, psicológica y sexual

**Capacitación de la policía para
atender problemas de violencia
y consumo de drogas**

Motivos de violencia

**Características del
agresor y de las mujeres
que sufren violencia**

**Leyes, Justicia, papel de
la policía y apoyo social**

Violencia

Ciclo de violencia

**Causas que
impiden denuncia**

Afrontamiento de violencia

Actitud ante la denuncia

Consecuencias de violencia

Violencia y consumo de drogas

Situación de Pareja


Categoría: Conocimiento y Utilidad de las Leyes



Análisis Cualitativo



Conclusiones Parciales



Modelo Operacional Crítico-Holístico aplicado al Estudio Multicéntrico sobre "Drogas, Mujeres y Violencia en las Américas" (Wright, 2006)

Resultados Cuantitativos del Estudio Piloto Multicéntrico en Brasil

Florianópolis /SC

Rio de Janeiro /RJ – UFRJ y UERJ


Ribeirão Preto /SP

São Bernardo do Campo /SP

Características Sociodemográficas (Variables Continuas)

Muestra poblacional	148 casos <ul style="list-style-type: none">▪ Florianópolis-SC: $n=29$▪ Rio de Janeiro-RJ: UFRJ $n=29$ / UERJ $n=30$▪ Ribeirão Preto-SP: USP $n=30$▪ São Bernardo do Campo-SP: ABC $n=30$
Edad promedio	35 años
Nivel de escolaridad	promedio de 11 años (educación secundaria)
Número de hijos	1 hijo (promedio: 1,66)
Número de parejas en la vida	promedio 5 parejas
Estado marital	52% mujeres viven con su pareja
Estado laboral	53% Mujeres tienen trabajo remunerado <ul style="list-style-type: none">▪ 70% trabajadora servicios▪ Otras trabajan como comerciantes y vendedoras; trabajo técnico-administrativo


Rangos de la Escala de Depresión por Ciudad (Escala de Radloff, 1977)



n = 148

No hay diferencias entre ciudades $p > 0.05$

Consumo de Bebidas Alcohólicas por Ciudad (TWEAK, Cyr & McGarry, 2002)



■ Consumo Sensato

■ Riesgo de Alcoholismo

■ Probable Alcoholismo

n = 148

n 1 (Consumen alcohol) = 78

n 2 (No consumen alcohol) = 70

No hay diferencias entre ciudades $p > 0.05$


Drogas Psicoactivas

(Sobell & Sobell, 2003)

Tipo de Consumo	Tipo de Drogas
Drogas Ilícitas 32,4% de la muestra	<ul style="list-style-type: none">▪ Cannabis (11,5%)▪ Alucinógenos (3,4%)▪ Inhalantes (3,4%)▪ Cocaína y Crack (2,7%)
Drogas de Prescripción Médica 25,7% de la muestra	<ul style="list-style-type: none">▪ Benzodiazepinas (16,2%)▪ Anfetaminas (6,8%)▪ Opiáceos (Morfina, Codeína) (5,4%)▪ Sedativos / Barbitúricos (4,1%)

n = 148


Comparación entre Consumo de Drogas Ilícitas en la Vida y en el Último Año



No hay diferencias entre ciudades $p > 0.05$

$n = 148$
 n Consumen = 67


Comparación entre Consumo de Drogas de Prescripción Médica en la Vida y en el Último Año por Ciudad



No hay diferencias entre ciudades $p > 0.05$

$n = 148$
 n Consumen = 19

Víctimas de Violencia Física por Ciudad (Escala de Violencia, Peragallo & González, 2006)




edad adulta: RP es diferente de SBC $p < 0.05$

$n = 148$
 n Víctimas Violencia Física = 68

Víctimas de Violencia Sexual por Ciudad


(Escala de Violencia, Peragallo & González, 2006)



antes 18: RP es diferente de SBC $p < 0.05$

$n = 148$
 n Víctimas Violencia Sexual = 33


Víctimas de Violencia Verbal por Ciudad (Escala de Violencia, Peragallo & González, 2006)




No hay diferencias entre ciudades $p > 0.05$

$n = 148$
 n Víctimas Violencia Verbal = 132

Cruce de Variables: Consumo de Drogas - Alcohol



Cruce de Variables: Consumo de Drogas - Cannabis



Cruce de Variables: Consumo de Drogas - Benzodiacepinas




Conclusiones Parciales




Modelo Operacional Crítico-Holístico aplicado al Estudio Multicéntrico sobre "Drogas, Mujeres y Violencia en las Américas" (Wright, 2006)

Conclusiones Parciales



Modelo Operacional Crítico-Holístico aplicado al Estudio Multicéntrico sobre "Drogas, Mujeres y Violencia en las Américas" (Wright, 2006)

Conclusiones Parciales



Modelo Operacional Crítico-Holístico aplicado al Estudio Multicéntrico sobre "Drogas, Mujeres y Violencia en las Américas" (Wright, 2006)

Resultados Cuantitativos del Estudio Piloto Multicéntrico en EEUU

Mujeres de Lengua Española e
Inglés* en los condados de
Miami-Dade y Broward

*La muestra de participantes de lengua Portuguesa ($n = 10$) no se ha completado


Características Sociodemográficas

Muestra	82 casos
Edad promedio	39 años
Años de escuela	14 años
Número de hijos (promedio)	2 hijos
Número de parejas íntimas en la vida (promedio)	3 parejas
Viviendo con pareja	63%
Estado marital	57% casadas, 18% solteras, 9% divorciada, 7% separadas, 6% unión libre, 3% viuda
Estado laboral	40% Mujeres tienen trabajo remunerado
Ingreso de mujer (ingreso de familia)	\$505/mes (\$2,355/mes)


Características Sociodemográficas

Tiempo en los EEUU (promedio)	9 años
País de origen	Colombia (48%), Venezuela (13%), Ecuador (8%), Caribe (10%), Otro Centro América (10%), Otro Sur América (9%), EEUU (2%)
Preferencia de Idioma	Español (96%), Inglés (4%)
Aculturación Escala de Marín y Gamba, 1995	<ul style="list-style-type: none">▪ Americana (alta) 62%▪ Hispana (alta) 100%▪ Alta en ambas 38%

Rangos de Escala de Autoestima (Rosenberg, 1965) y Depresión (Radloff, 1977)



Consumo de Bebidas Alcohólicas por Grupo: (TWEAK, Cyr & McGarry, 2002)



■ Consumo Sensato

■ Riesgo de Alcoholismo


■ Probable Alcoholismo

Drogas Psicoactivas

(Sobell & Sobell, 2003)

Tipo de Consumo	Tipo de Drogas
Drogas Ilícitas	<ul style="list-style-type: none">▪ Cannabis (10%)▪ Cocaína y Crack (5%)▪ Heroína (1%)▪ Alucinógenos (1%)▪ Inhalantes (0%)
Drogas de Prescripción Médica	<ul style="list-style-type: none">▪ Benzodiazepinas (17%)▪ Opiáceos (Morfina, Codeína, etc.) (4%)▪ Sedativos / Barbitúricos (0%)▪ Anfetaminas (1%)

Comparación entre Consumo de Drogas Ilícitas y de Prescripción Médica en la Vida y en el Último Año




■ Alguna vez en la vida

■ En el último año

n = 82

Víctimas de Violencia por Tipo de Abuso (Escala de Violencia, Peragallo & Gonzalez, 2006)



■ Antes de los 18 años de edad

■ Edad Adulta

n = 82

Resultados Cualitativos del Estudio Piloto Multicéntrico en EEUU

**Mujeres de Lengua Española e Inglesa* en
los condados de Miami-Dade y Broward**

***La muestra de participantes de lengua portuguesa ($n = 10$) no se ha
completado**

Temas Centrales

- Vivir en los Estados Unidos
- “El Ciclo Vicioso del Abuso”
- “Rompiendo el Silencio”

Vivir en los Estados Unidos

El impacto en la familia

- La necesidad de trabajar interfiere con la crianza de los niños;
- El estrés del trabajo destruye el matrimonio.

Influencias liberales americanas

- La violencia, sexo y el abuso de drogas es normal para los niños en los EEUU;
- Demasiado independencia.

Manteniendo la cultura propia

- Mandar los niños a sus país para que aprendan bien;
- Mantener las costumbres y tradiciones;
- Obtener un balance entre la cultura americana y la cultura hispana.

Discriminación

- No saber hablar español;
- En el trabajo;
- Discriminación de americanos;
- Discriminación de otros hispanos.

“El Ciclo Vicioso del Abuso”

Tipos de violencia

- Física
- Abuso sexual y explotación
- Abuso Intelectual
- Control, manipulación, falta de apoyo en la casa

Causas y riesgos del abuso

- Mujeres como la causa
- Machismo e desigualdades de genero
- Infidelidad
- Transmisión transgeneracional
- Inmigración a los EEUU
- Diferencias de edad entre parejas
- Abuso de drogas y alcohol

Barreras para obtener ayuda

- Manteniendo la familia unida
- Dependencia económica
- Miedo
- Estatus legal
- No querer estar sola
- Falta de apoyo y servicios
- Esperanza de cambio
- Querer proteger el abusador

Autoestima

- El abusador prepara su territorio bajando la autoestima de la víctima
- Como riesgo de abuso
- Como consecuencia abuso

El ciclo

- Impacto de violencia en los niños
- Aumento de gravedad con tiempo
- Transmisión de violencia a la comunidad
- Víctimas se convierten en abusadoras

“Rompiendo el Silencio”

Obteniendo información

- Derechos en situaciones de violencia
- Servicios en la comunidad

Atención a si mismo

- Cuidado de la apariencia
- Siguiendo intuición propia
- Desarrollando independencia
- Teniendo fe en Dios

Comunicación entre pareja

- Sobre problemas cuando comienzan
- No permitir que te falten el respeto
- Sobre lo que te gusta y no te gusta


Rompiendo normas culturales y tabúes

- Decidiendo romper el patrón de violencia en la casa
- No criar niños “machistas”
- Enseñando a los hijos sobre la violencia y las drogas
- Hablando con amistades sobre la violencia y drogas

Apoyo

- Alguien que te haga consiente del abuso y riesgos
- Alguien que te conecte con servicios
- Teniendo lugares y servicios a donde ir

Conclusiones Parciales



Modelo Operacional Crítico-Holístico aplicado al Estudio Multicéntrico sobre "Drogas, Mujeres y Violencia en las Américas" (Wright, 2006)

**CONCLUSIONES PRELIMINARES DEL
ESTUDIO PILOTO MULTICÉNTRICO
SOBRE “DROGAS, MUJERES Y
VIOLENCIA EN LAS AMÉRICAS”**

Conclusiones Preliminares

Violencia y Drogas

- Son los mayores problemas enfrentados por las mujeres estudiadas, especialmente en Latinoamérica. Esta situación como consecuencia produce baja estima y aumenta la depresión;
- El abuso de drogas produce el aumento de maltrato psicológico y violencia física y sexual.

Problemática Drogas

- Alcohol constituye un serio problema, especialmente entre las mujeres latinoamericanas, pero no es así para la mujer hispánica que vive en los EEUU (Miami-Dade y Broward, Florida), aun cuando sean afectadas a través de sus parejas;
- Mujeres estudiadas tienen conocimiento de:
 - Tipo drogas, frecuencia consumo, personas involucradas, contexto consumo;
 - Consciencia consumo, situaciones peligrosas, prácticas protectoras;
 - Necesidad de prevención, educación y atención;
 - Dificultad de acceso a servicios sociales, de salud y tratamiento de drogas.

Conclusiones Preliminares(2)

Problemática de la Violencia

- La violencia contra la mujer constituye un problema de gran seriedad;
- La violencia intrafamiliar es evidente en la muestra estudiada;
- El uso de drogas lícitas e ilícitas por el hombre propicia violencia psicológica, física y sexual contra las mujeres;
- Mujeres tienen conocimiento del tipo y patrón de violencia, de problemas relacionados con la denuncia, y del apoyo social.

Conocimiento y Utilidad de las Leyes

- Mujeres se sienten desprotegidas dentro del Sistema Judicial y Legislación en los países estudiados de América Latina, excepto Brasil;
- La policía no se encuentra preparada para trabajar con la problemática de drogas y violencia contra la mujer.

**RECOMENDACIONES PRELIMINARES
DEL ESTUDIO PILOTO MULTICÉNTRICO
SOBRE “DROGAS, MUJERES Y
VIOLENCIA EN LAS AMÉRICAS”**

Recomendaciones Preliminares

OEA

- Apoyar a los países de América Latina a actualizar sus leyes frente a la situación del abuso de drogas y violencia contra la mujer, como en Brasil;
- Diseminar los resultados del estudio para los gobiernos de los países, organizaciones internacionales, nacionales y sociedad civil.

CICAD

- Desarrollar programas de entrenamientos regionales a policías sobre protección y tratamiento drogas y violencia contra las mujeres;
- Establecer en SDEI un programa específico de investigación sobre la protección a la mujer contra drogas y violencia en América Latina;
- Buscar fondos externos para apoyar el programa propuesto de investigación y para el Estudio Multicéntrico Final;
- Identificar e invitar a los centros de excelencia en investigación para participar en el programa propuesto de investigación.
- Diseminar los resultados del estudio para diferentes departamentos y secretarías de la OEA.

Recomendaciones Preliminares(2)

Países

- Adecuar y aplicar leyes de protección a las mujeres;
- Capacitar a nivel nacional a la policía sobre protección y tratamiento drogas y violencia contra mujeres;
- Mejorar el mecanismo para operar normas y leyes sobre la protección a la mujer;
- Intervenciones dirigidas a este grupo de mujeres deben:
 - Incluir El aspecto de genero en todos los programas;
 - Promover la independencia de la mujer y condenar papeles tradicionales de género que pueden aumentar riesgos de violencia;
 - Desarrollar la comunicación y habilidad de manejar conflictos entre parejas;
 - Informar y orientar las mujeres sobre sus derechos en situaciones de violencia y cómo ellas pueden prevenir la transmisión de violencia;
 - Ayudar las mujeres a manejar el estrés de estar entre dos culturas (muestra de mujeres latinas en Miami-Dade y Broward, Florida).

Agradecimientos

Gobierno de los Estados Unidos

Gobierno del Brasil

**Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas – CICAD
Sección de Desarrollo Educacional e Investigación – SDER/CICAD**

**Secretaria Nacional Antidrogas de Brasil – SENAD
Secretaria Nacional de Seguridad Pública de Brasil – SENASP**

Universidades participantes

Mujeres participantes