



OEA | CICAD



**COMISION INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS
CICAD**

**SEXAGÉSIMO CUARTO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
Del 19 al 21 de noviembre de 2018
Washington, D.C., EE.UU**

**OEA/Ser.L/XIV.2.64
CICAD/doc.2444/18
21 de noviembre de 2018
Original: Español**

**Vulnerabilidad social y consumo de drogas
Dos estudios sobre pasta base de cocaína en el Uruguay
Aproximaciones cuantitativas y etnográficas
2012 - 2018**

Vulnerabilidad social y consumo de drogas

Dos estudios sobre pasta base de cocaína en el Uruguay. Aproximaciones cuantitativas y etnográficas 2012 - 2018


**Observatorio Uruguayo de Drogas- Junta Nacional de Drogas
Cátedra de Antropología- Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Programa Nacional ITS-VIH/Sida. Ministerio Salud Pública
Fondo de Población de las Naciones Unidas
Instituto de Estadística de Facultad de Economía y Administración**

MÉTODO

- Estudio basado en RDS: Muestreo Dirigido por el Entrevistado
- Se ha popularizado en el mundo para medir la prevalencia de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual en poblaciones ocultas (aquellas a las que no se puede llegar con los muestreos y metodologías habituales, por ej. una encuesta de hogares).
- Basada en incentivos y en redes de contacto (supuesto principal).

Población a la que abarca: Usuarios de pasta base, crack u otra denominación que tenga la cocaína fumable con consumo de al menos 25 días durante los seis meses anteriores a la encuesta y/o individuos que se hayan inyectado al menos una vez alguna de esas sustancias en el mismo período de tiempo, residentes en Montevideo y Área Metropolitana.


MÉTODO







ANTECEDENTES (2012) - Perfil consumidor de pasta base de cocaína.



- Edad promedio: 29 años
- 27% en situación de calle
- 63.7 % con 6 años o menos de escolarización.
- 41% ha pasado por algún dispositivo de tratamiento.
- 6.3% HIV positivo

Índice temático

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA - La fractura social

PAUTAS DE CONSUMO – Estados alterados de conciencia

ATENCIÓN Y TRATAMIENTO – ¿Hay demanda?

RELACION DROGA Y DELITO – La ruta del deterioro

Distribución sexo y edad (Muestra RDS) vs. Población general.

EDAD PROMEDIO DE LA BASE RDS: 33.44

	Usuarios cocaína fumable (%)	Personas de 18 a 60 años, % Montevideo
Hombre	86.3	47.4
Mujer	13.7	52.6
18 a 25	23.3	20.9
26 a 35	38.2	24.3
36 a 45	28.1	20.4
46 a 60	10.5	34.4

ÚLTIMO NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO (Muestra RDS)

Primaria incompleta / Sin instrucción	10,4
Primaria completa aprobada	27,4
Enseñanza Media Básica Incompleta	29,5
Enseñanza Media Básica Completa	16,8
Enseñanza Media Superior Incompleta	9,1
Enseñanza Media Superior Completa	3,3
Universitaria incompleta	1,3
Universidad completa	0
Otros	2,2


Distribución de la muestra según fuente de ingreso (últimos 12 meses)

Trabajo sin contrato formal, trabajos temporales, changas	69,2
Recolectar latas, cartones, buscar en basuras, limpiar parabrisas o similar	38,3
Venta ambulante (calle, buses)	30,9
Trabajo con contrato formal	26,9
Pedir limosna, mendigar	24,2
Ingresos de pareja, amigos o familia	16,8
Robo, hurto	13,9
Relaciones sexuales por dinero	12,3
Pensión/otros	12,1
Seguro de desempleo	7,1
Venta de drogas	6,4
Asistencia Pública, beneficencia o similar	6,1

Distribución según lugar donde vivió (últimos 12 meses)

En refugio, albergue	25,3
En la calle	25,1
Casa, apartamento de sus padres, parientes, amigos	19,7
Casa o apartamento propio o de su pareja	9,7
Cuarto rentado de hotel, pensión, residencia	8,4
Casa, apartamento rentado por él/ella o su pareja	6,2
Rancho, carpa, recinto sin agua corriente ni alcantarillado	3,1
Cárcel o centro de reforma para menores	1,7
Centro de tratamiento, otros	0,8

Uso sustancias en los últimos 12 meses



El 8.5% declara haberse inyectado drogas alguna vez en la vida.

Frecuencia de consumo últimos 12 meses

Base: consumidores de la sustancia

Frecuencia de consumo PBC	%
Algunas veces mensualmente	14.2
Algunas veces semanalmente	50.9
Diariamente	34.9

Frecuencia de consumo Cocaína	%
Una sola vez	5.1
Algunas veces últimos 12 meses	39.4
Algunas veces mensualmente	15.9
Algunas veces semanalmente	30.3
Diariamente	9.2

Frecuencia de consumo Tabaco	%
Algunas veces últimos 12 meses	1.2
Algunas veces mensualmente	3.3
Algunas veces semanalmente	8.0
Diariamente	87.5

Frecuencia de consumo alcohol	%
Una vez al mes o menos	17.0
2 a 4 veces al mes	26.9
2 o 3 veces a la semana	19.3
4 o mas veces a la semana	36.8

Frecuencia de consumo últimos 12 meses

Base: consumidores de la sustancia

Frecuencia de consumo Marihuana	%
Una sola vez	1.3
Algunas veces	9.3
Algunas veces mensualmente	6.8
Algunas veces semanalmente	20.4
Diariamente	62.2

Frecuencia de consumo Tranquilizantes	%
Una sola vez	3.8
Algunas veces últimos 12 meses	19.1
Algunas veces mensualmente	13.5
Algunas veces semanalmente	12.4
Diariamente	51.1

Patrones de consumo PBC


¿Dónde ha consumido pasta base en los últimos 12 meses?

Calle/Plaza/baldio/callejones	79,2
Casa o apto propio o pareja	25,2
Casa abandonada/lugar cerrado pub	9,9
Casa o apto donde se la venden	6,7
Lugar de trabajo	2,7
Baño público	1,7
Casa o apto de padres/fliares	1,6
Bares/discotecas/fiestas	1,5
Locales o patios centros de estudio	0,1
Otros	10,8

*¿En los últimos 12 meses, con qué personas ha consumido pasta base?
(RM)*


Lo ha hecho solo/a	53.5
Conocidos	24.9
Amigos	19.0
Pareja	9.0
La barra de consumo	2.9
Desconocidos o extraños	7.5
Otros	1.5

Edad promedio de inicio según droga.



Acceso y demanda de atención y tratamiento por consumo de drogas

¿Alguna vez ha recibido tratamiento para dejar o controlar el consumo de drogas?




Tipos de tratamientos recibidos para dejar o controlar las drogas

Centro público de tratamiento	26,9
Hospitales / Centro de atención mental públicos	24,0
Iglesias / comunidad religiosa	17,1
Narcóticos Anónimos	15,5
Alcohólicos Anónimos	10,0
Policlínicas barriales	9,7
Centro públicos de atención en drogas	9,4
Centro de tratamiento para menores	4,7
Centro de tratamiento privado	2,4
Comunidades Terapéuticas	2,3
Grupos de autoayuda ces. tabáquica	1,8
Mutualista	1,3
Clínicas psiquiátricas particulares	0,5
Consultorios externos	0,5
Otros no especificados	12,9


Antecedentes de conflicto con la ley

Alguna vez en centro para menores por cometer delitos




Antecedentes de conflicto con la ley

Alguna vez en prisión




Estudio sobre consumo de drogas en personas privadas de libertad y factores asociados – 2016

Distribución de hombres privados de libertad según realizaron o no el primer delito previo al consumo de pasta base




- Primero el delito, luego el consumo
- Primero el consumo, luego el delito
- Delito y consumo a la misma edad

Distribución de mujeres privadas de libertad según realizaron o no el primer delito previo al consumo de pasta base



- Primero el delito, luego el consumo
- Primero el consumo, luego el delito
- Delito y consumo a la misma edad

Prevalencia HIV + - Test rápido



La prevalencia en población general es del 0,45%

En conclusión...

- Población altamente masculinizada.
- Socialmente aislada en el espacio urbano.
- Situación de calle instalada.
- Alejada de los servicios públicos.
- Padecen el estigma y el temor social.
- Su prevalencia de HIV + es 20 veces mayor que la población en general.

Muchas gracias por su atención

Contacto

jnd@presidencia.gub.uy
gub.uy/jnd